

表 3381 使用透析液の種類 性別（腹膜透析単独患者）

性別	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
男性 (%)	1,234 (41.9)	306 (10.4)	77 (2.6)	5 (0.2)	26 (0.9)	815 (27.7)	263 (9.9)	212 (7.2)	6 (0.2)	2,944 (100.0)	4	1,552	4,500
女性 (%)	760 (43.7)	210 (12.1)	53 (3.0)	7 (0.4)	26 (1.5)	386 (22.2)	159 (9.1)	135 (7.8)	4 (0.2)	1,740 (100.0)	2	862	2,604
合計 (%)	1,994 (42.6)	516 (11.0)	130 (2.8)	12 (0.3)	52 (1.1)	1,201 (25.6)	422 (9.0)	347 (7.4)	10 (0.2)	4,684 (100.0)	6	2,414	7,104
記載なし (%)													
総計 (%)	1,994 (42.6)	516 (11.0)	130 (2.8)	12 (0.3)	52 (1.1)	1,201 (25.6)	422 (9.0)	347 (7.4)	10 (0.2)	4,684 (100.0)	6	2,414	7,104

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査