

表 3382 使用透析液の種類 年齢(歳)別（腹膜透析単独患者）

年齢	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満（%）	14 (23.3)	23 (38.3)	6 (10.0)	4 (6.7)	1 (1.7)			8 (13.3)	4 (6.7)	60 (100.0)		29	89
15歳～（%）	22 (39.3)	10 (17.9)	6 (10.7)	1 (1.8)	5 (8.9)		7 (12.5)	5 (8.9)		56 (100.0)		32	88
30歳～（%）	150 (47.6)	31 (9.8)	8 (2.5)	1 (0.3)	2 (0.6)	69 (21.9)	29 (9.2)	25 (7.9)		315 (100.0)		188	503
45歳～（%）	481 (42.3)	113 (9.9)	34 (3.0)		6 (0.5)	296 (26.1)	113 (9.9)	90 (7.9)	3 (0.3)	1,136 (100.0)	2	588	1,726
60歳～（%）	916 (44.6)	209 (10.2)	36 (1.8)	5 (0.2)	17 (0.8)	547 (26.6)	192 (9.3)	130 (6.3)	2 (0.1)	2,054 (100.0)	3	1,020	3,077
75歳～（%）	386 (39.3)	118 (12.0)	33 (3.4)	1 (0.1)	23 (2.3)	263 (26.8)	76 (7.7)	80 (8.2)	1 (0.1)	981 (100.0)	1	514	1,496
90歳～（%）	25 (30.5)	12 (14.6)	7 (8.5)		4 (4.9)	20 (24.4)	5 (6.1)	9 (11.0)		82 (100.0)		43	125
合計（%）	1,994 (42.6)	516 (11.0)	130 (2.8)	12 (0.3)	52 (1.1)	1,201 (25.6)	422 (9.0)	347 (7.4)	10 (0.2)	4,684 (100.0)	6	2,414	7,104
不明（%）													
記載なし（%）													
総計（%）	1,994 (42.6)	516 (11.0)	130 (2.8)	12 (0.3)	52 (1.1)	1,201 (25.6)	422 (9.0)	347 (7.4)	10 (0.2)	4,684 (100.0)	6	2,414	7,104
平均	63.39	62.65	61.20	41.17	72.52	65.06	63.29	62.87	39.60	63.63	64.33	63.27	63.50
標準偏差	13.97	18.56	21.59	31.91	13.92	12.93	13.54	17.04	30.23	15.00	10.69	15.27	15.09

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査