

表 3383 使用透析液の種類 現在施行中のPD歴(年)別（腹膜透析単独患者）

現在施行中のPD歴	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
1年未満	709	62	34		28	301	48	64	3	1,249		74	1,326
(%)	(56.8)	(5.0)	(2.7)		(2.2)	(24.1)	(3.8)	(5.1)	(0.2)	(100.0)			
1年～	432	103	30	1	15	289	86	79	1	1,036		30	1,067
(%)	(41.7)	(9.9)	(2.9)	(0.1)	(1.4)	(27.9)	(8.3)	(7.6)	(0.1)	(100.0)			
2年～	500	156	31	3	5	333	119	90	4	1,241	1	27	1,269
(%)	(40.3)	(12.6)	(2.5)	(0.2)	(0.4)	(26.8)	(9.6)	(7.3)	(0.3)	(100.0)			
4年～	193	92	16	2	2	153	72	52	1	583		22	605
(%)	(33.1)	(15.8)	(2.7)	(0.3)	(0.3)	(26.2)	(12.3)	(8.9)	(0.2)	(100.0)			
6年～	71	25	5	1		54	44	27		227		9	236
(%)	(31.3)	(11.0)	(2.2)	(0.4)		(23.8)	(19.4)	(11.9)		(100.0)			
8年～	24	22	5	1	1	18	17	10		98	1	2	101
(%)	(24.5)	(22.4)	(5.1)	(1.0)	(1.0)	(18.4)	(17.3)	(10.2)		(100.0)			
10年～	25	30	7			13	16	11	1	103		5	108
(%)	(24.3)	(29.1)	(6.8)			(12.6)	(15.5)	(10.7)	(1.0)	(100.0)			
合計	1,954	490	128	8	51	1,161	402	333	10	4,537	6	169	4,712
(%)	(43.1)	(10.8)	(2.8)	(0.2)	(1.1)	(25.6)	(8.9)	(7.3)	(0.2)	(100.0)			
記載なし	40	26	2	4	1	40	20	14		147		2,245	2,392
(%)	(27.2)	(17.7)	(1.4)	(2.7)		(27.2)	(13.6)	(9.5)		(100.0)			
総計	1,994	516	130	12	52	1,201	422	347	10	4,684	6	2,414	7,104
(%)	(42.6)	(11.0)	(2.8)	(0.3)	(1.1)	(25.6)	(9.0)	(7.4)	(0.2)	(100.0)			
平均	2.18	3.78	3.16	4.09	1.29	2.53	3.74	3.25	3.37	2.68	2.49	2.39	2.67
標準偏差	2.24	3.57	3.81	2.44	1.58	2.16	2.91	2.87	4.37	2.64	3.67	2.82	2.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査