

表 3384 使用透析液の種類 原疾患別（腹膜透析単独患者）

原疾患	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	654 (%)	191 (45.4)	39 (12.6)	4 (0.3)	15 (1.0)	336 (23.3)	129 (9.0)	76 (5.5)	3 (0.2)	1,438 (100.0)	2	705	2,146
慢性腎盂腎炎	29 (%)	9 (51.8)		1 (1.8)		12 (21.4)	2 (3.6)	3 (5.4)		56 (100.0)		22	78
急速進行性糸球体腎炎	13 (%)	6 (39.4)				5 (15.2)	3 (9.1)	5 (15.2)	1 (3.0)	33 (100.0)		22	55
妊婦腎/妊婦中毒症	5 (%)	3 (35.7)	1 (7.1)				2 (14.3)	3 (21.4)		14 (100.0)		4	18
その他の分岐不能の腎炎	15 (%)	4 (42.9)	2 (5.7)			6 (17.1)	6 (17.1)	2 (5.7)		35 (100.0)		24	59
多発性囊胞腎	74 (%)	15 (51.0)	4 (2.8)			33 (22.8)	8 (5.5)	9 (6.2)	2 (1.4)	145 (100.0)		80	225
腎硬化症	281 (%)	57 (43.5)	13 (2.0)	1 (0.2)	7 (1.1)	179 (27.7)	64 (9.9)	44 (6.8)		646 (100.0)		297	943
悪性高血圧	29 (%)	5 (48.3)	2 (3.3)			14 (23.3)	6 (10.0)	4 (6.7)		60 (100.0)		27	87
糖尿病性腎症	520 (%)	147 (35.4)	39 (10.0)	1 (0.1)	16 (1.1)	453 (30.8)	148 (10.1)	144 (9.8)	3 (0.2)	1,471 (100.0)	2	853	2,326
SLE腎炎	12 (%)	1 (52.2)			1 (4.3)	3 (13.0)	2 (8.7)	4 (17.4)		23 (100.0)		17	40
アミロイド腎	2 (%)	2 (22.2)	1 (11.1)			3 (33.3)		1 (11.1)		9 (100.0)		4	13
痛風腎	8 (%)	2 (44.4)				5 (27.8)	3 (16.7)			18 (100.0)		5	23
先天性代謝異常による腎不全	3 (%)	3 (30.0)	1 (10.0)			3 (30.0)				10 (100.0)	1	4	15
腎・尿路結核	1 (%)					1 (50.0)				2 (100.0)			2
腎・尿路結石	6 (%)	1 (42.9)	1 (7.1)		1 (7.1)	2 (14.3)		3 (21.4)		14 (100.0)		3	17
腎・尿路腫瘍	4 (%)		1 (14.3)			1 (14.3)	1 (14.3)			7 (100.0)		3	10
閉塞性尿路障害	10 (%)	2 (58.8)				2 (11.8)	2 (11.8)		1 (5.9)	17 (100.0)		2	19
骨髄腫						2 (40.0)	1 (20.0)	2 (40.0)		5 (100.0)		2	7
腎形成不全	15 (%)	12 (34.1)	9 (20.5)			2 (4.5)	2 (4.5)	4 (9.1)		44 (100.0)		23	67
不明	244 (%)	40 (53.2)	13 (2.8)		7 (1.5)	104 (22.7)	28 (6.1)	23 (5.0)		459 (100.0)		223	682
再導入	10 (%)	5 (40.0)				3 (12.0)	4 (16.0)	3 (12.0)		25 (100.0)		16	41
その他	59 (%)	21 (38.9)	5 (3.3)	5 (3.3)	5 (3.3)	32 (21.1)	11 (7.2)	14 (9.2)		152 (100.0)	1	78	231
合計	1,994 (42.6)	516 (11.0)	130 (2.8)	12 (0.3)	52 (1.1)	1,201 (25.6)	422 (9.0)	347 (7.4)	10 (0.2)	4,684 (100.0)	6	2,414	7,104
記載なし													
総計	1,994 (42.6)	516 (11.0)	130 (2.8)	12 (0.3)	52 (1.1)	1,201 (25.6)	422 (9.0)	347 (7.4)	10 (0.2)	4,684 (100.0)	6	2,414	7,104

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査