

表 3385 使用透析液の種類 医療機関別（腹膜透析単独患者）

医療機関	1.5%液のみ	1.5%液と2.5%液の併用	2.5%液のみ	4.25%液のみ（イコデキストリンなし）	イコデキストリン単独（ブドウ糖使用なし）	1.5%+イコデキストリン	1.5%+2.5%+イコデキストリン	2.5%+イコデキストリン	4.25%液+イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	166	23	6		2	93	38	25		353		250	603
（%）	(47.0)	(6.5)	(1.7)		(0.6)	(26.3)	(10.8)	(7.1)		(100.0)			
私立大学	264	63	12	1	8	141	38	36		563		379	942
（%）	(46.9)	(11.2)	(2.1)	(0.2)	(1.4)	(25.0)	(6.7)	(6.4)		(100.0)			
国立	79	15	3		1	34	14	7	3	156		46	202
（%）	(50.6)	(9.6)	(1.9)		(0.6)	(21.8)	(9.0)	(4.5)	(1.9)	(100.0)			
県市町村立	382	93	35	5	9	231	83	62	1	901	2	402	1,305
（%）	(42.4)	(10.3)	(3.9)	(0.6)	(1.0)	(25.6)	(9.2)	(6.9)	(0.1)	(100.0)			
社会保険	82	21			1	65	5	3		177		298	475
（%）	(46.3)	(11.9)			(0.6)	(36.7)	(2.8)	(1.7)		(100.0)			
厚生連	110	53	10	4	5	88	24	30		324		127	451
（%）	(34.0)	(16.4)	(3.1)	(1.2)	(1.5)	(27.2)	(7.4)	(9.3)		(100.0)			
その他公的	336	74	23		9	216	63	45		766		373	1,139
（%）	(43.9)	(9.7)	(3.0)		(1.2)	(28.2)	(8.2)	(5.9)		(100.0)			
私立総合	73	32	10		1	29	25	25	1	196		49	245
（%）	(37.2)	(16.3)	(5.1)		(0.5)	(14.8)	(12.8)	(12.8)	(0.5)	(100.0)			
私立	369	112	24	2	11	223	92	87	4	924	2	409	1,335
（%）	(39.9)	(12.1)	(2.6)	(0.2)	(1.2)	(24.1)	(10.0)	(9.4)	(0.4)	(100.0)			
私立診療所	133	30	7		5	81	40	27	1	324	2	81	407
（%）	(41.0)	(9.3)	(2.2)		(1.5)	(25.0)	(12.3)	(8.3)	(0.3)	(100.0)			
総計	1,994	516	130	12	52	1,201	422	347	10	4,684	6	2,414	7,104
（%）	(42.6)	(11.0)	(2.8)	(0.3)	(1.1)	(25.6)	(9.0)	(7.4)	(0.2)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査