

表 3393 一日透析液使用量(L/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	95 (3.1)	275 (9.0)	724 (23.7)	1,217 (39.9)	677 (22.2)	50 (1.6)	12 (0.4)	3,050 (100.0)	1,852	4,902	5.85	1.93
腹膜透析 (APD) (%)	41 (2.3)	82 (4.6)	313 (17.4)	594 (33.0)	477 (26.5)	210 (11.7)	84 (4.7)	1,801 (100.0)	974	2,775	7.36	2.82
腹膜透析 (CCPD) (%)	6 (0.8)	16 (2.2)	54 (7.5)	193 (26.8)	253 (35.2)	118 (16.4)	79 (11.0)	719 (100.0)	373	1,092	8.53	2.72
合計 (%)	142 (2.5)	373 (6.7)	1,091 (19.6)	2,004 (36.0)	1,407 (25.3)	378 (6.8)	175 (3.1)	5,570 (100.0)	3,199	8,769	6.69	2.56
記載なし (%)												
総計 (%)	142 (2.5)	373 (6.7)	1,091 (19.6)	2,004 (36.0)	1,407 (25.3)	378 (6.8)	175 (3.1)	5,570 (100.0)	3,199	8,769	6.69	2.56

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査