

表 3394 一日透析液使用量(L/日) 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)									1	1		
PD単独 (%)	128 (2.8)	355 (7.8)	997 (21.9)	1,674 (36.7)	1,040 (22.8)	257 (5.6)	110 (2.4)	4,561 (100.0)	2,543	7,104	6.44	2.51
HD(F)単独,PDカテ あり (%)												
PD,HD併用週1 HD(F) (%)	11 (1.3)	13 (1.5)	73 (8.4)	275 (31.7)	324 (37.4)	113 (13.0)	58 (6.7)	867 (100.0)	603	1,470	7.95	2.46
PD,HD併用週2 HD(F) (%)	3 (3.2)	4 (4.2)	19 (20.0)	37 (38.9)	25 (26.3)	4 (4.2)	3 (3.2)	95 (100.0)	37	132	6.57	2.38
PD,HD併用週3 HD(F) (%)												
PD,HD併用週4 HD(F) (%)												
PD,HD併用その他 (%)		1 (2.1)	2 (4.3)	18 (38.3)	18 (38.3)	4 (8.5)	4 (8.5)	47 (100.0)	15	62	7.80	2.11
合計 (%)	142 (2.5)	373 (6.7)	1,091 (19.6)	2,004 (36.0)	1,407 (25.3)	378 (6.8)	175 (3.1)	5,570 (100.0)	3,199	8,769	6.69	2.56
不明 (%)												
記載なし (%)												
総計 (%)	142 (2.5)	373 (6.7)	1,091 (19.6)	2,004 (36.0)	1,407 (25.3)	378 (6.8)	175 (3.1)	5,570 (100.0)	3,199	8,769	6.69	2.56

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査