

表 3395 一日透析液使用量(L/日) 性別（腹膜透析患者）

性別	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	84	170	627	1,201	1,040	292	139	3,553	2,121	5,674	6.99	2.59
(%)	(2.4)	(4.8)	(17.6)	(33.8)	(29.3)	(8.2)	(3.9)	(100.0)				
女性	58	203	464	803	367	86	36	2,017	1,078	3,095	6.15	2.39
(%)	(2.9)	(10.1)	(23.0)	(39.8)	(18.2)	(4.3)	(1.8)	(100.0)				
合計	142	373	1,091	2,004	1,407	378	175	5,570	3,199	8,769	6.69	2.56
(%)	(2.5)	(6.7)	(19.6)	(36.0)	(25.3)	(6.8)	(3.1)	(100.0)				
記載なし												
(%)												
総計	142	373	1,091	2,004	1,407	378	175	5,570	3,199	8,769	6.69	2.56
(%)	(2.5)	(6.7)	(19.6)	(36.0)	(25.3)	(6.8)	(3.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査