

表 3396 一日透析液使用量(L/日) 年齢(歳)別(腹膜透析患者)

年齢	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	7 (11.7)	12 (20.0)	15 (25.0)	6 (10.0)	7 (11.7)	2 (3.3)	11 (18.3)	60 (100.0)	29	89	7.54	6.47
15歳～ (%)	3 (4.9)	4 (6.6)	11 (18.0)	14 (23.0)	14 (23.0)	6 (9.8)	9 (14.8)	61 (100.0)	40	101	8.01	4.63
30歳～ (%)	9 (2.3)	15 (3.8)	60 (15.3)	136 (34.6)	111 (28.2)	42 (10.7)	20 (5.1)	393 (100.0)	267	660	7.29	2.68
45歳～ (%)	27 (1.8)	50 (3.4)	214 (14.6)	499 (34.1)	463 (31.6)	147 (10.0)	64 (4.4)	1,464 (100.0)	856	2,320	7.29	2.52
60歳～ (%)	44 (1.8)	136 (5.5)	446 (18.1)	970 (39.3)	656 (26.6)	153 (6.2)	65 (2.6)	2,470 (100.0)	1,353	3,823	6.72	2.30
75歳～ (%)	42 (4.0)	134 (12.9)	318 (30.6)	365 (35.1)	148 (14.2)	27 (2.6)	6 (0.6)	1,040 (100.0)	609	1,649	5.58	2.10
90歳～ (%)	10 (12.2)	22 (26.8)	27 (32.9)	14 (17.1)	8 (9.8)	1 (1.2)		82 (100.0)	45	127	4.46	2.17
合計 (%)	142 (2.5)	373 (6.7)	1,091 (19.6)	2,004 (36.0)	1,407 (25.3)	378 (6.8)	175 (3.1)	5,570 (100.0)	3,199	8,769	6.69	2.56
不明 (%)												
記載なし (%)												
総計 (%)	142 (2.5)	373 (6.7)	1,091 (19.6)	2,004 (36.0)	1,407 (25.3)	378 (6.8)	175 (3.1)	5,570 (100.0)	3,199	8,769	6.69	2.56
平均	64.51	68.59	66.15	63.63	60.54	57.70	52.65	62.95	62.54	62.80		
標準偏差	21.52	18.44	15.27	12.67	12.59	13.00	17.35	14.48	14.74	14.58		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査