

表 3397 一日透析液使用量(L/日) 現在施行中のPD歴(年)別(腹膜透析患者)

現在施行中のPD 歴	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	63	143	365	430	193	32	16	1,242	123	1,365	5.68	2.36
(%)	(5.1)	(11.5)	(29.4)	(34.6)	(15.5)	(2.6)	(1.3)	(100.0)				
1年～	34	89	235	403	255	63	27	1,106	64	1,170	6.47	2.54
(%)	(3.1)	(8.0)	(21.2)	(36.4)	(23.1)	(5.7)	(2.4)	(100.0)				
2年～	22	83	263	561	370	118	42	1,459	58	1,517	6.86	2.52
(%)	(1.5)	(5.7)	(18.0)	(38.5)	(25.4)	(8.1)	(2.9)	(100.0)				
4年～	13	37	127	281	210	79	37	784	38	822	7.13	2.62
(%)	(1.7)	(4.7)	(16.2)	(35.8)	(26.8)	(10.1)	(4.7)	(100.0)				
6年～	2	6	42	130	144	29	18	371	25	396	7.62	2.26
(%)	(0.5)	(1.6)	(11.3)	(35.0)	(38.8)	(7.8)	(4.9)	(100.0)				
8年～	2	4	32	61	73	17	12	201	13	214	7.46	2.50
(%)	(1.0)	(2.0)	(15.9)	(30.3)	(36.3)	(8.5)	(6.0)	(100.0)				
10年～	3	4	14	88	97	28	17	251	9	260	7.81	2.36
(%)	(1.2)	(1.6)	(5.6)	(35.1)	(38.6)	(11.2)	(6.8)	(100.0)				
合計	139	366	1,078	1,954	1,342	366	169	5,414	330	5,744	6.67	2.56
(%)	(2.6)	(6.8)	(19.9)	(36.1)	(24.8)	(6.8)	(3.1)	(100.0)				
記載なし	3	7	13	50	65	12	6	156	2,869	3,025	7.38	2.25
(%)	(1.9)	(4.5)	(8.3)	(32.1)	(41.7)	(7.7)	(3.8)	(100.0)				
総計	142	373	1,091	2,004	1,407	378	175	5,570	3,199	8,769	6.69	2.56
(%)	(2.5)	(6.7)	(19.6)	(36.0)	(25.3)	(6.8)	(3.1)	(100.0)				
平均	1.92	2.01	2.35	3.25	4.10	4.29	4.78	3.28	2.74	3.25		
標準偏差	2.31	2.22	2.32	3.15	3.62	3.52	3.80	3.21	3.02	3.20		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査