

表 3399 一日透析液使用量(L/日) 医療機関別(腹膜透析患者)

医療機関	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	5	28	70	123	94	24	10	354	309	663	6.78	2.31
(%)	(1.4)	(7.9)	(19.8)	(34.7)	(26.6)	(6.8)	(2.8)	(100.0)				
私立大学	22	49	151	200	148	42	19	631	475	1,106	6.41	2.57
(%)	(3.5)	(7.8)	(23.9)	(31.7)	(23.5)	(6.7)	(3.0)	(100.0)				
国立	14	21	36	60	24	11	4	170	52	222	6.01	2.90
(%)	(8.2)	(12.4)	(21.2)	(35.3)	(14.1)	(6.5)	(2.4)	(100.0)				
県市町村立	28	68	195	383	248	60	47	1,029	544	1,573	6.81	2.95
(%)	(2.7)	(6.6)	(19.0)	(37.2)	(24.1)	(5.8)	(4.6)	(100.0)				
社会保険	2	20	41	59	64	13	6	205	317	522	6.76	2.55
(%)	(1.0)	(9.8)	(20.0)	(28.8)	(31.2)	(6.3)	(2.9)	(100.0)				
厚生連	10	23	53	152	125	23	5	391	169	560	6.76	2.17
(%)	(2.6)	(5.9)	(13.6)	(38.9)	(32.0)	(5.9)	(1.3)	(100.0)				
その他公的	12	62	158	362	207	44	28	873	486	1,359	6.62	2.41
(%)	(1.4)	(7.1)	(18.1)	(41.5)	(23.7)	(5.0)	(3.2)	(100.0)				
私立総合	3	7	88	96	62	22	5	283	80	363	6.47	2.21
(%)	(1.1)	(2.5)	(31.1)	(33.9)	(21.9)	(7.8)	(1.8)	(100.0)				
私立	33	63	215	401	305	85	29	1,131	568	1,699	6.72	2.43
(%)	(2.9)	(5.6)	(19.0)	(35.5)	(27.0)	(7.5)	(2.6)	(100.0)				
私立診療所	13	32	84	168	130	54	22	503	199	702	7.02	2.63
(%)	(2.6)	(6.4)	(16.7)	(33.4)	(25.8)	(10.7)	(4.4)	(100.0)				
総計	142	373	1,091	2,004	1,407	378	175	5,570	3,199	8,769	6.69	2.56
(%)	(2.5)	(6.7)	(19.6)	(36.0)	(25.3)	(6.8)	(3.1)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査