

表 3400 一日透析液使用量(L/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	2未満	2~	4~	6~	8~	10~	12~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	91 (3.6)	265 (10.4)	658 (25.8)	1,015 (39.9)	474 (18.6)	33 (1.3)	10 (0.4)	2,546 (100.0)	1,532	4,078	5.65	1.92
腹膜透析 (APD) (%)	34 (2.2)	76 (5.0)	292 (19.2)	512 (33.7)	394 (26.0)	157 (10.3)	53 (3.5)	1,518 (100.0)	775	2,293	7.16	2.77
腹膜透析 (CCPD) (%)	3 (0.6)	14 (2.8)	47 (9.5)	147 (29.6)	172 (34.6)	67 (13.5)	47 (9.5)	497 (100.0)	236	733	8.25	2.69
合計 (%)	128 (2.8)	355 (7.8)	997 (21.9)	1,674 (36.7)	1,040 (22.8)	257 (5.6)	110 (2.4)	4,561 (100.0)	2,543	7,104	6.44	2.51
記載なし (%)												
総計 (%)	128 (2.8)	355 (7.8)	997 (21.9)	1,674 (36.7)	1,040 (22.8)	257 (5.6)	110 (2.4)	4,561 (100.0)	2,543	7,104	6.44	2.51

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査