

表 3401 一日透析液使用量(L/日) 性別（腹膜透析単独患者）

性別	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	76	162	574	998	777	190	82	2,859	1,641	4,500	6.71	2.54
(%)	(2.7)	(5.7)	(20.1)	(34.9)	(27.2)	(6.6)	(2.9)	(100.0)				
女性	52	193	423	676	263	67	28	1,702	902	2,604	5.98	2.39
(%)	(3.1)	(11.3)	(24.9)	(39.7)	(15.5)	(3.9)	(1.6)	(100.0)				
合計	128	355	997	1,674	1,040	257	110	4,561	2,543	7,104	6.44	2.51
(%)	(2.8)	(7.8)	(21.9)	(36.7)	(22.8)	(5.6)	(2.4)	(100.0)				
記載なし												
(%)												
総計	128	355	997	1,674	1,040	257	110	4,561	2,543	7,104	6.44	2.51
(%)	(2.8)	(7.8)	(21.9)	(36.7)	(22.8)	(5.6)	(2.4)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査