

表 3402 一日透析液使用量(L/日) 年齢(歳)別(腹膜透析単独患者)

年齢	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	7 (11.7)	12 (20.0)	15 (25.0)	6 (10.0)	7 (11.7)	2 (3.3)	11 (18.3)	60 (100.0)	29	89	7.54	6.47
15歳～ (%)	3 (5.6)	4 (7.4)	10 (18.5)	13 (24.1)	11 (20.4)	5 (9.3)	8 (14.8)	54 (100.0)	34	88	7.95	4.86
30歳～ (%)	5 (1.7)	15 (5.0)	52 (17.2)	105 (34.7)	87 (28.7)	26 (8.6)	13 (4.3)	303 (100.0)	200	503	7.07	2.46
45歳～ (%)	22 (2.0)	46 (4.1)	185 (16.6)	406 (36.5)	329 (29.6)	94 (8.5)	30 (2.7)	1,112 (100.0)	614	1,726	6.97	2.41
60歳～ (%)	41 (2.0)	128 (6.4)	410 (20.4)	806 (40.1)	475 (23.6)	106 (5.3)	44 (2.2)	2,010 (100.0)	1,067	3,077	6.51	2.28
75歳～ (%)	40 (4.3)	128 (13.6)	298 (31.7)	324 (34.5)	123 (13.1)	23 (2.4)	4 (0.4)	940 (100.0)	556	1,496	5.47	2.06
90歳～ (%)	10 (12.2)	22 (26.8)	27 (32.9)	14 (17.1)	8 (9.8)	1 (1.2)		82 (100.0)	43	125	4.46	2.17
合計 (%)	128 (2.8)	355 (7.8)	997 (21.9)	1,674 (36.7)	1,040 (22.8)	257 (5.6)	110 (2.4)	4,561 (100.0)	2,543	7,104	6.44	2.51
不明 (%)												
記載なし (%)												
総計 (%)	128 (2.8)	355 (7.8)	997 (21.9)	1,674 (36.7)	1,040 (22.8)	257 (5.6)	110 (2.4)	4,561 (100.0)	2,543	7,104	6.44	2.51
平均	65.25	68.52	66.52	64.09	60.74	58.46	50.70	63.59	63.34	63.50		
標準偏差	21.96	18.73	15.42	12.88	13.17	13.86	20.31	15.00	15.26	15.09		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査