

表 3403 一日透析液使用量(L/日) 現在施行中のPD歴(年)別(腹膜透析単独患者)

現在施行中のPD 歴	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満	63	141	361	419	180	29	13	1,206	120	1,326	5.62	2.33
(%)	(5.2)	(11.7)	(29.9)	(34.7)	(14.9)	(2.4)	(1.1)	(100.0)				
1年～	30	84	225	380	224	49	18	1,010	57	1,067	6.33	2.45
(%)	(3.0)	(8.3)	(22.3)	(37.6)	(22.2)	(4.9)	(1.8)	(100.0)				
2年～	17	79	240	477	289	92	28	1,222	47	1,269	6.70	2.48
(%)	(1.4)	(6.5)	(19.6)	(39.0)	(23.6)	(7.5)	(2.3)	(100.0)				
4年～	10	32	107	211	147	45	30	582	23	605	6.94	2.68
(%)	(1.7)	(5.5)	(18.4)	(36.3)	(25.3)	(7.7)	(5.2)	(100.0)				
6年～	2	5	28	89	73	15	10	222	14	236	7.36	2.25
(%)	(0.9)	(2.3)	(12.6)	(40.1)	(32.9)	(6.8)	(4.5)	(100.0)				
8年～	1	4	19	23	39	5	4	95	6	101	7.11	2.51
(%)	(1.1)	(4.2)	(20.0)	(24.2)	(41.1)	(5.3)	(4.2)	(100.0)				
10年～	2	3	7	36	36	14	5	103	5	108	7.59	2.42
(%)	(1.9)	(2.9)	(6.8)	(35.0)	(35.0)	(13.6)	(4.9)	(100.0)				
合計	125	348	987	1,635	988	249	108	4,440	272	4,712	6.42	2.51
(%)	(2.8)	(7.8)	(22.2)	(36.8)	(22.3)	(5.6)	(2.4)	(100.0)				
記載なし	3	7	10	39	52	8	2	121	2,271	2,392	7.17	2.14
(%)	(2.5)	(5.8)	(8.3)	(32.2)	(43.0)	(6.6)	(1.7)	(100.0)				
総計	128	355	997	1,674	1,040	257	110	4,561	2,543	7,104	6.44	2.51
(%)	(2.8)	(7.8)	(21.9)	(36.7)	(22.8)	(5.6)	(2.4)	(100.0)				
平均	1.70	1.90	2.09	2.70	3.33	3.66	4.04	2.70	2.18	2.67		
標準偏差	2.09	1.95	2.04	2.61	3.00	3.12	3.34	2.65	2.60	2.65		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査