

表 3414 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 併用の状況別(腹膜透析患者)

併用の状況	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)								1	1		
PD単独 (%)	495 (12.8)	672 (17.4)	1,018 (26.4)	938 (24.3)	444 (11.5)	296 (7.7)	3,863 (100.0)	3,241	7,104	725.34	565.30
HD(F)単独,PDカテ あり (%)											
PD,HD併用週1 HD(F) (%)	419 (57.7)	181 (24.9)	79 (10.9)	32 (4.4)	10 (1.4)	5 (0.7)	726 (100.0)	744	1,470	183.72	315.44
PD,HD併用週2 HD(F) (%)	25 (67.6)	6 (16.2)	4 (10.8)	2 (5.4)			37 (100.0)	95	132	139.73	254.66
PD,HD併用週3 HD(F) (%)											
PD,HD併用週4 HD(F) (%)											
PD,HD併用その他 (%)	20 (51.3)	11 (28.2)	7 (17.9)	1 (2.6)			39 (100.0)	23	62	177.44	250.25
合計 (%)	959 (20.6)	870 (18.6)	1,108 (23.8)	973 (20.9)	454 (9.7)	301 (6.5)	4,665 (100.0)	4,104	8,769	631.82	568.54
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)	959 (20.6)	870 (18.6)	1,108 (23.8)	973 (20.9)	454 (9.7)	301 (6.5)	4,665 (100.0)	4,104	8,769	631.82	568.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査