

表 3420 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD)	255	396	583	511	251	160	2,156	1,922	4,078	723.94	561.52
(%)	(11.8)	(18.4)	(27.0)	(23.7)	(11.6)	(7.4)	(100.0)				
腹膜透析 (APD)	157	177	323	348	161	121	1,287	1,006	2,293	783.37	580.55
(%)	(12.2)	(13.8)	(25.1)	(27.0)	(12.5)	(9.4)	(100.0)				
腹膜透析 (CCPD)	83	99	112	79	32	15	420	313	733	554.70	499.82
(%)	(19.8)	(23.6)	(26.7)	(18.8)	(7.6)	(3.6)	(100.0)				
合計	495	672	1,018	938	444	296	3,863	3,241	7,104	725.34	565.30
(%)	(12.8)	(17.4)	(26.4)	(24.3)	(11.5)	(7.7)	(100.0)				
記載なし (%)											
総計	495	672	1,018	938	444	296	3,863	3,241	7,104	725.34	565.30
(%)	(12.8)	(17.4)	(26.4)	(24.3)	(11.5)	(7.7)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査