

表 3422 残存腎機能(一日尿量)(mL/日) 年齢(歳)別(腹膜透析単独患者)

年齢	100未満	100～	400～	800～	1200～	1600～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満	29	7	11	2		2	51	38	89	275.47	537.24
(%)	(56.9)	(13.7)	(21.6)	(3.9)		(3.9)	(100.0)				
15歳～	23	5	8	8	2	2	48	40	88	415.67	561.84
(%)	(47.9)	(10.4)	(16.7)	(16.7)	(4.2)	(4.2)	(100.0)				
30歳～	33	47	58	59	29	29	255	248	503	790.29	657.64
(%)	(12.9)	(18.4)	(22.7)	(23.1)	(11.4)	(11.4)	(100.0)				
45歳～	131	151	226	248	123	82	961	765	1,726	753.91	580.62
(%)	(13.6)	(15.7)	(23.5)	(25.8)	(12.8)	(8.5)	(100.0)				
60歳～	196	308	465	418	213	136	1,736	1,341	3,077	741.54	564.45
(%)	(11.3)	(17.7)	(26.8)	(24.1)	(12.3)	(7.8)	(100.0)				
75歳～	77	139	230	195	71	43	755	741	1,496	690.61	496.35
(%)	(10.2)	(18.4)	(30.5)	(25.8)	(9.4)	(5.7)	(100.0)				
90歳～	6	15	20	8	6	2	57	68	125	582.89	492.55
(%)	(10.5)	(26.3)	(35.1)	(14.0)	(10.5)	(3.5)	(100.0)				
合計	495	672	1,018	938	444	296	3,863	3,241	7,104	725.34	565.30
(%)	(12.8)	(17.4)	(26.4)	(24.3)	(11.5)	(7.7)	(100.0)				
不明											
(%)											
記載なし											
(%)											
総計	495	672	1,018	938	444	296	3,863	3,241	7,104	725.34	565.30
(%)	(12.8)	(17.4)	(26.4)	(24.3)	(11.5)	(7.7)	(100.0)				
平均	57.73	64.25	65.10	63.79	63.46	61.26	63.21	63.86	63.50		
標準偏差	20.01	14.56	14.56	13.02	12.08	13.60	14.87	15.35	15.09		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査