

表 3433 一日平均除水量(mL/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	−1000未満	−1000～	0～	1000～	2000～	3000～	4000～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD)	15 (0.5)	159 (5.8)	1,775 (64.6)	749 (27.3)	41 (1.5)	3 (0.1)	5 (0.2)	2,747 (100.0)	2,155	4,902	676.76	553.11
腹膜透析 (APD)	2 (0.1)	52 (3.1)	1,210 (72.5)	379 (22.7)	24 (1.4)	2 (0.1)		1,669 (100.0)	1,106	2,775	657.64	476.08
腹膜透析 (CCPD)		12 (1.9)	389 (60.0)	235 (36.3)	12 (1.9)			648 (100.0)	444	1,092	831.57	465.84
合計	17 (0.3)	223 (4.4)	3,374 (66.6)	1,363 (26.9)	77 (1.5)	5 (0.1)	5 (0.1)	5,064 (100.0)	3,705	8,769	690.27	520.90
記載なし (%)												
総計	17 (0.3)	223 (4.4)	3,374 (66.6)	1,363 (26.9)	77 (1.5)	5 (0.1)	5 (0.1)	5,064 (100.0)	3,705	8,769	690.27	520.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査