

表 3434 一日平均除水量(mL/日) 併用の状況別(腹膜透析患者)

併用の状況	－1000未満	－1000～	0～	1000～	2000～	3000～	4000～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)									1	1		
PD単独 (%)	15 (0.4)	217 (5.2)	2,902 (69.9)	956 (23.0)	58 (1.4)	1 (0.0)	5 (0.1)	4,154 (100.0)	2,950	7,104	636.43	512.96
HD(F)単独,PDカテ あり (%)												
PD,HD併用週1 HD(F) (%)	2 (0.3)	6 (0.8)	388 (49.6)	366 (46.8)	16 (2.0)	4 (0.5)		782 (100.0)	688	1,470	948.03	497.29
PD,HD併用週2 HD(F) (%)			56 (63.6)	30 (34.1)	2 (2.3)			88 (100.0)	44	132	869.35	420.84
PD,HD併用週3 HD(F) (%)												
PD,HD併用週4 HD(F) (%)												
PD,HD併用その他 (%)			28 (70.0)	11 (27.5)	1 (2.5)			40 (100.0)	22	62	848.75	344.18
合計 (%)	17 (0.3)	223 (4.4)	3,374 (66.6)	1,363 (26.9)	77 (1.5)	5 (0.1)	5 (0.1)	5,064 (100.0)	3,705	8,769	690.27	520.90
不明 (%)												
記載なし (%)												
総計 (%)	17 (0.3)	223 (4.4)	3,374 (66.6)	1,363 (26.9)	77 (1.5)	5 (0.1)	5 (0.1)	5,064 (100.0)	3,705	8,769	690.27	520.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査