

表 3440 一日平均除水量(mL/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	-1000未満	-1000～	0～	1000～	2000～	3000～	4000～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	14 (0.6)	156 (6.8)	1,541 (67.1)	546 (23.8)	33 (1.4)	1 (0.0)	5 (0.2)	2,296 (100.0)	1,782	4,078	626.12	554.26
腹膜透析 (APD) (%)	1 (0.1)	50 (3.6)	1,064 (75.8)	270 (19.2)	18 (1.3)			1,403 (100.0)	890	2,293	608.22	449.73
腹膜透析 (CCPD) (%)		11 (2.4)	297 (65.3)	140 (30.8)	7 (1.5)			455 (100.0)	278	733	775.40	455.06
合計 (%)	15 (0.4)	217 (5.2)	2,902 (69.9)	956 (23.0)	58 (1.4)	1 (0.0)	5 (0.1)	4,154 (100.0)	2,950	7,104	636.43	512.96
記載なし (%)												
総計 (%)	15 (0.4)	217 (5.2)	2,902 (69.9)	956 (23.0)	58 (1.4)	1 (0.0)	5 (0.1)	4,154 (100.0)	2,950	7,104	636.43	512.96

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査