

表 3444 一日平均除水量(mL/日) 原疾患別 (腹膜透析単独患者)

原疾患	－1000未満	－1000～	0～	1000～	2000～	3000～	4000～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	3 (0.2)	50 (3.9)	903 (69.9)	319 (24.7)	14 (1.1)	1 (0.1)	2 (0.2)	1,292 (100.0)	854	2,146	656.79	499.23
慢性腎盂腎炎 (%)		4 (8.2)	36 (73.5)	8 (16.3)	1 (2.0)			49 (100.0)	29	78	575.82	467.56
急速進行性糸球 体腎炎 (%)		1 (3.2)	20 (64.5)	9 (29.0)	1 (3.2)			31 (100.0)	24	55	776.06	517.83
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)			7 (53.8)	6 (46.2)				13 (100.0)	5	18	853.85	431.92
その他の分類不 能の腎炎 (%)		1 (3.1)	21 (65.6)	8 (25.0)	2 (6.3)			32 (100.0)	27	59	713.34	535.04
多発性嚢胞腎 (%)	2 (1.5)	6 (4.6)	102 (77.9)	21 (16.0)				131 (100.0)	94	225	532.19	473.91
腎硬化症 (%)	3 (0.5)	27 (4.8)	416 (74.3)	111 (19.8)	3 (0.5)			560 (100.0)	383	943	585.50	462.11
悪性高血圧 (%)		4 (9.3)	28 (65.1)	9 (20.9)	2 (4.7)			43 (100.0)	44	87	639.79	579.45
糖尿病性腎症 (%)	6 (0.5)	74 (5.6)	864 (65.9)	338 (25.8)	26 (2.0)		3 (0.2)	1,311 (100.0)	1,015	2,326	674.58	555.76
SLE腎炎 (%)			15 (65.2)	8 (34.8)				23 (100.0)	17	40	724.13	448.30
アミロイド腎 (%)			5 (71.4)	2 (28.6)				7 (100.0)	6	13	645.43	395.20
痛風腎 (%)		1 (7.1)	9 (64.3)	3 (21.4)	1 (7.1)			14 (100.0)	9	23	749.29	620.74
先天性代謝異常 による腎不全 (%)			8 (80.0)	2 (20.0)				10 (100.0)	5	15	605.00	456.10
腎・尿路結核 (%)			2 (100.0)					2 (100.0)		2	575.00	530.33
腎・尿路結石 (%)			10 (76.9)	3 (23.1)				13 (100.0)	4	17	762.08	324.04
腎・尿路腫瘍 (%)			6 (100.0)					6 (100.0)	4	10	551.83	342.11
閉塞性尿路障害 (%)		1 (7.7)	9 (69.2)	3 (23.1)				13 (100.0)	6	19	561.54	422.23
骨髄腫 (%)			2 (50.0)	2 (50.0)				4 (100.0)	3	7	882.75	470.80
腎形成不全 (%)		4 (9.1)	32 (72.7)	7 (15.9)	1 (2.3)			44 (100.0)	23	67	561.16	479.77
不明 (%)	1 (0.3)	32 (8.2)	290 (74.0)	64 (16.3)	5 (1.3)			392 (100.0)	290	682	543.60	496.67
再導入 (%)		1 (4.5)	16 (72.7)	5 (22.7)				22 (100.0)	19	41	666.32	321.37
その他 (%)		11 (7.7)	101 (71.1)	28 (19.7)	2 (1.4)			142 (100.0)	89	231	592.27	509.48
合計 (%)	15 (0.4)	217 (5.2)	2,902 (69.9)	956 (23.0)	58 (1.4)	1 (0.0)	5 (0.1)	4,154 (100.0)	2,950	7,104	636.43	512.96
記載なし (%)												
総計 (%)	15 (0.4)	217 (5.2)	2,902 (69.9)	956 (23.0)	58 (1.4)	1 (0.0)	5 (0.1)	4,154 (100.0)	2,950	7,104	636.43	512.96

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査