

表 3456 APD使用の有無 年齢(歳)別(腹膜透析患者)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)		61 (100.0)	61 (100.0)		28	89
15歳～ (%)	17 (27.0)	46 (73.0)	63 (100.0)		38	101
30歳～ (%)	176 (44.7)	218 (55.3)	394 (100.0)	2	264	660
45歳～ (%)	699 (47.6)	771 (52.4)	1,470 (100.0)	4	846	2,320
60歳～ (%)	1,402 (56.2)	1,094 (43.8)	2,496 (100.0)	7	1,320	3,823
75歳～ (%)	683 (64.8)	371 (35.2)	1,054 (100.0)	1	594	1,649
90歳～ (%)	49 (64.5)	27 (35.5)	76 (100.0)		51	127
合計 (%)	3,026 (53.9)	2,588 (46.1)	5,614 (100.0)	14	3,141	8,769
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	3,026 (53.9)	2,588 (46.1)	5,614 (100.0)	14	3,141	8,769
平均	65.37	60.06	62.92	59.14	62.60	62.80
標準偏差	12.79	15.78	14.49	10.45	14.74	14.58

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査