

表 3462 APD使用の有無 年齢(歳)別 (腹膜透析単独患者)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)		61 (100.0)	61 (100.0)		28	89
15歳～ (%)	14 (24.6)	43 (75.4)	57 (100.0)		31	88
30歳～ (%)	141 (46.4)	163 (53.6)	304 (100.0)	1	198	503
45歳～ (%)	542 (48.7)	570 (51.3)	1,112 (100.0)	1	613	1,726
60歳～ (%)	1,161 (57.3)	864 (42.7)	2,025 (100.0)	6	1,046	3,077
75歳～ (%)	621 (65.1)	333 (34.9)	954 (100.0)	1	541	1,496
90歳～ (%)	48 (64.0)	27 (36.0)	75 (100.0)		50	125
合計 (%)	2,527 (55.1)	2,061 (44.9)	4,588 (100.0)	9	2,507	7,104
不明 (%)						
記載なし (%)						
総計 (%)	2,527 (55.1)	2,061 (44.9)	4,588 (100.0)	9	2,507	7,104
平均	66.13	60.37	63.54	62.56	63.44	63.50
標準偏差	12.89	16.75	15.02	10.43	15.23	15.09

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査