

表 3473 1日のPD実施時間(時間/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	1~	5~	9~	13~	18~	24	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD)	136	102	214	258	112	2,150	2,972	1,930	4,902	20.57	6.22
(%)	(4.6)	(3.4)	(7.2)	(8.7)	(3.8)	(72.3)	(100.0)				
腹膜透析 (APD)	47	654	375	80	48	529	1,733	1,042	2,775	13.66	7.35
(%)	(2.7)	(37.7)	(21.6)	(4.6)	(2.8)	(30.5)	(100.0)				
腹膜透析 (CCPD)	15	86	105	81	85	339	711	381	1,092	17.96	6.82
(%)	(2.1)	(12.1)	(14.8)	(11.4)	(12.0)	(47.7)	(100.0)				
合計	198	842	694	419	245	3,018	5,416	3,353	8,769	18.01	7.37
(%)	(3.7)	(15.5)	(12.8)	(7.7)	(4.5)	(55.7)	(100.0)				
記載なし (%)											
総計	198	842	694	419	245	3,018	5,416	3,353	8,769	18.01	7.37
(%)	(3.7)	(15.5)	(12.8)	(7.7)	(4.5)	(55.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査