

表 3480 1日のPD実施時間(時間/日) 治療方法(新分類)別(腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	1~	5~	9~	13~	18~	24	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD)	106	94	198	234	91	1,758	2,481	1,597	4,078	20.41	6.27
(%)	(4.3)	(3.8)	(8.0)	(9.4)	(3.7)	(70.9)	(100.0)				
腹膜透析 (APD)	45	585	328	58	25	412	1,453	840	2,293	13.14	7.25
(%)	(3.1)	(40.3)	(22.6)	(4.0)	(1.7)	(28.4)	(100.0)				
腹膜透析 (CCPD)	14	60	82	54	50	232	492	241	733	17.65	6.98
(%)	(2.8)	(12.2)	(16.7)	(11.0)	(10.2)	(47.2)	(100.0)				
合計	165	739	608	346	166	2,402	4,426	2,678	7,104	17.71	7.46
(%)	(3.7)	(16.7)	(13.7)	(7.8)	(3.8)	(54.3)	(100.0)				
記載なし (%)											
総計	165	739	608	346	166	2,402	4,426	2,678	7,104	17.71	7.46
(%)	(3.7)	(16.7)	(13.7)	(7.8)	(3.8)	(54.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査