

表 3493 PD透析液交換方法 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫 外線)	バッグ交換デバイス(熱 式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も 含む)	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD) (%)	1,075 (35.0)	1,527 (49.7)	407 (13.2)	63 (2.1)	3,072 (100.0)	8	1,822	4,902
腹膜透析 (APD) (%)	409 (23.1)	1,016 (57.3)	286 (16.1)	63 (3.6)	1,774 (100.0)	14	987	2,775
腹膜透析 (CCPD) (%)	220 (30.7)	370 (51.6)	96 (13.4)	31 (4.3)	717 (100.0)	7	368	1,092
合計 (%)	1,704 (30.6)	2,913 (52.4)	789 (14.2)	157 (2.8)	5,563 (100.0)	29	3,177	8,769
記載なし (%)								
総計 (%)	1,704 (30.6)	2,913 (52.4)	789 (14.2)	157 (2.8)	5,563 (100.0)	29	3,177	8,769

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査