

表 3498 PD透析液交換方法 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫 外線)	バッグ交換デバイス(熱 式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も 含む)	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	637 (34.4)	906 (48.9)	242 (13.1)	66 (3.6)	1,851 (100.0)	11	968	2,830
慢性腎盂腎炎 (%)	20 (29.9)	37 (55.2)	8 (11.9)	2 (3.0)	67 (100.0)	3	27	97
急速進行性糸球 体腎炎 (%)	4 (10.3)	21 (53.8)	11 (28.2)	3 (7.7)	39 (100.0)		27	66
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)	11 (52.4)	7 (33.3)	3 (14.3)		21 (100.0)		6	27
その他の分類不 能の腎炎 (%)	18 (39.1)	24 (52.2)	3 (6.5)	1 (2.2)	46 (100.0)	1	31	78
多発性嚢胞腎 (%)	53 (31.0)	88 (51.5)	21 (12.3)	9 (5.3)	171 (100.0)	2	90	263
腎硬化症 (%)	223 (31.0)	369 (51.3)	107 (14.9)	20 (2.8)	719 (100.0)	3	373	1,095
悪性高血圧 (%)	15 (23.1)	40 (61.5)	10 (15.4)		65 (100.0)		42	107
糖尿病性腎症 (%)	426 (25.0)	997 (58.4)	245 (14.4)	38 (2.2)	1,706 (100.0)	4	1,089	2,799
SLE腎炎 (%)	13 (46.4)	13 (46.4)	2 (7.1)		28 (100.0)		18	46
アミロイド腎 (%)	5 (55.6)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	9 (100.0)		6	15
痛風腎 (%)	11 (45.8)	9 (37.5)	4 (16.7)		24 (100.0)		8	32
先天性代謝異常 による腎不全 (%)	2 (16.7)	8 (66.7)	2 (16.7)		12 (100.0)	1	4	17
腎・尿路結核 (%)	1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)			2
腎・尿路結石 (%)	6 (35.3)	8 (47.1)	2 (11.8)	1 (5.9)	17 (100.0)		4	21
腎・尿路腫瘍 (%)	3 (33.3)	4 (44.4)	1 (11.1)	1 (11.1)	9 (100.0)		5	14
閉塞性尿路障害 (%)	2 (12.5)	9 (56.3)	5 (31.3)		16 (100.0)		5	21
骨髄腫 (%)		4 (100.0)			4 (100.0)		3	7
腎形成不全 (%)	18 (38.3)	19 (40.4)	9 (19.1)	1 (2.1)	47 (100.0)		25	72
不明 (%)	176 (34.6)	248 (48.7)	75 (14.7)	10 (2.0)	509 (100.0)	2	331	842
再導入 (%)	10 (32.3)	13 (41.9)	8 (25.8)		31 (100.0)	1	23	55
その他 (%)	50 (29.4)	86 (50.6)	30 (17.6)	4 (2.4)	170 (100.0)	1	92	263
合計 (%)	1,704 (30.6)	2,913 (52.4)	789 (14.2)	157 (2.8)	5,563 (100.0)	29	3,177	8,769
記載なし (%)								
総計 (%)	1,704 (30.6)	2,913 (52.4)	789 (14.2)	157 (2.8)	5,563 (100.0)	29	3,177	8,769

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査