

表 3514 2015年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 併用の状況別(腹膜透析患者)

併用の状況	0	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)								1	1		
PD単独 (%)	3,746 (85.6)	443 (10.1)	120 (2.7)	32 (0.7)	13 (0.3)	23 (0.5)	4,377 (100.0)	2,727	7,104	0.24	0.84
HD(F)単独.PDカテ あり (%)											
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	747 (88.4)	79 (9.3)	12 (1.4)	5 (0.6)		2 (0.2)	845 (100.0)	625	1,470	0.16	0.58
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	86 (91.5)	7 (7.4)		1 (1.1)			94 (100.0)	38	132	0.11	0.40
PD.HD併用週3 HD(F) (%)											
PD.HD併用週4 HD(F) (%)											
PD.HD併用その他 (%)	41 (91.1)	4 (8.9)					45 (100.0)	17	62	0.09	0.29
合計 (%)	4,620 (86.2)	533 (9.9)	132 (2.5)	38 (0.7)	13 (0.2)	25 (0.5)	5,361 (100.0)	3,408	8,769	0.22	0.80
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)	4,620 (86.2)	533 (9.9)	132 (2.5)	38 (0.7)	13 (0.2)	25 (0.5)	5,361 (100.0)	3,408	8,769	0.22	0.80

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査