

表 3516 2015年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 年齢(歳)別(腹膜透析患者)

年齢	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	51 (85.0)	6 (10.0)	2 (3.3)	1 (1.7)			60 (100.0)	29	89	0.23	0.64
15歳～ (%)	55 (88.7)	6 (9.7)			1 (1.6)		62 (100.0)	39	101	0.18	0.68
30歳～ (%)	341 (87.9)	39 (10.1)	5 (1.3)		2 (0.5)	1 (0.3)	388 (100.0)	272	660	0.17	0.60
45歳～ (%)	1,268 (89.2)	108 (7.6)	30 (2.1)	8 (0.6)	2 (0.1)	6 (0.4)	1,422 (100.0)	898	2,320	0.18	0.69
60歳～ (%)	2,025 (85.9)	243 (10.3)	55 (2.3)	22 (0.9)	4 (0.2)	9 (0.4)	2,358 (100.0)	1,465	3,823	0.23	0.88
75歳～ (%)	816 (81.9)	124 (12.4)	37 (3.7)	6 (0.6)	4 (0.4)	9 (0.9)	996 (100.0)	653	1,649	0.30	0.84
90歳～ (%)	64 (85.3)	7 (9.3)	3 (4.0)	1 (1.3)			75 (100.0)	52	127	0.22	0.61
合計 (%)	4,620 (86.2)	533 (9.9)	132 (2.5)	38 (0.7)	13 (0.2)	25 (0.5)	5,361 (100.0)	3,408	8,769	0.22	0.80
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)	4,620 (86.2)	533 (9.9)	132 (2.5)	38 (0.7)	13 (0.2)	25 (0.5)	5,361 (100.0)	3,408	8,769	0.22	0.80
平均	62.39	64.39	66.80	66.08	61.00	67.00	62.74	62.89	62.80		
標準偏差	14.54	14.86	14.36	13.87	17.79	13.18	14.59	14.55	14.58		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査