

表 3517 2015年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 現在施行中のPD歴(年)別 (腹膜透析患者)

現在施行中のPD歴	0	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	合計	不明記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満 (%)	1,081 (89.3)	58 (4.8)	36 (3.0)	11 (0.9)	6 (0.5)	19 (1.6)	1,211 (100.0)	154	1,365	0.31	1.19
1年~ (%)	917 (83.4)	134 (12.2)	34 (3.1)	8 (0.7)	4 (0.4)	3 (0.3)	1,100 (100.0)	70	1,170	0.24	0.64
2年~ (%)	1,213 (84.8)	169 (11.8)	34 (2.4)	12 (0.8)		2 (0.1)	1,430 (100.0)	87	1,517	0.21	0.78
4年~ (%)	649 (85.1)	95 (12.5)	14 (1.8)	3 (0.4)	1 (0.1)	1 (0.1)	763 (100.0)	59	822	0.18	0.50
6年~ (%)	323 (88.7)	33 (9.1)	6 (1.6)		2 (0.5)		364 (100.0)	32	396	0.15	0.47
8年~ (%)	169 (89.4)	17 (9.0)	3 (1.6)				189 (100.0)	25	214	0.12	0.37
10年~ (%)	213 (88.8)	22 (9.2)	4 (1.7)	1 (0.4)			240 (100.0)	20	260	0.14	0.42
合計 (%)	4,565 (86.2)	528 (10.0)	131 (2.5)	35 (0.7)	13 (0.2)	25 (0.5)	5,297 (100.0)	447	5,744	0.22	0.80
記載なし (%)	55 (85.9)	5 (7.8)	1 (1.6)	3 (4.7)			64 (100.0)	2,961	3,025	0.26	0.73
総計 (%)	4,620 (86.2)	533 (9.9)	132 (2.5)	38 (0.7)	13 (0.2)	25 (0.5)	5,361 (100.0)	3,408	8,769	0.22	0.80
平均	3.28	3.48	2.67	2.16	2.06	0.79	3.27	3.05	3.25		
標準偏差	3.24	3.00	2.48	2.06	2.45	1.10	3.19	3.26	3.20		

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

\*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査