

表 3522 2015年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年) 年齢(歳)別(腹膜透析単独患者)

年齢	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)	51 (85.0)	6 (10.0)	2 (3.3)	1 (1.7)			60 (100.0)	29	89	0.23	0.64
15歳～ (%)	50 (87.7)	6 (10.5)			1 (1.8)		57 (100.0)	31	88	0.20	0.70
30歳～ (%)	264 (88.3)	28 (9.4)	4 (1.3)		2 (0.7)	1 (0.3)	299 (100.0)	204	503	0.18	0.65
45歳～ (%)	955 (88.5)	84 (7.8)	25 (2.3)	7 (0.6)	2 (0.2)	6 (0.6)	1,079 (100.0)	647	1,726	0.20	0.76
60歳～ (%)	1,630 (85.3)	200 (10.5)	50 (2.6)	18 (0.9)	4 (0.2)	8 (0.4)	1,910 (100.0)	1,167	3,077	0.25	0.93
75歳～ (%)	733 (81.6)	112 (12.5)	36 (4.0)	5 (0.6)	4 (0.4)	8 (0.9)	898 (100.0)	598	1,496	0.31	0.84
90歳～ (%)	63 (85.1)	7 (9.5)	3 (4.1)	1 (1.4)			74 (100.0)	51	125	0.23	0.61
合計 (%)	3,746 (85.6)	443 (10.1)	120 (2.7)	32 (0.7)	13 (0.3)	23 (0.5)	4,377 (100.0)	2,727	7,104	0.24	0.84
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)	3,746 (85.6)	443 (10.1)	120 (2.7)	32 (0.7)	13 (0.3)	23 (0.5)	4,377 (100.0)	2,727	7,104	0.24	0.84
平均	62.99	65.00	67.38	65.59	61.00	66.17	63.34	63.77	63.50		
標準偏差	15.14	15.33	14.63	14.89	17.79	12.98	15.16	14.98	15.09		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査