

表 3534 2015年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 併用の状況別(腹膜透析患者)

併用の状況	0	1.0~	2.0~	3.0~	4.0~	5.0~	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)								1	1		
PD単独 (%)	3,446 (79.8)	525 (12.2)	169 (3.9)	76 (1.8)	44 (1.0)	59 (1.4)	4,319 (100.0)	2,785	7,104	0.40	1.13
HD(F)単独.PDカテ あり (%)											
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	679 (80.9)	112 (13.3)	35 (4.2)	8 (1.0)	1 (0.1)	4 (0.5)	839 (100.0)	631	1,470	0.29	0.85
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	70 (75.3)	18 (19.4)	3 (3.2)	1 (1.1)	1 (1.1)		93 (100.0)	39	132	0.33	0.70
PD.HD併用週3 HD(F) (%)											
PD.HD併用週4 HD(F) (%)											
PD.HD併用その他 (%)	43 (95.6)	1 (2.2)	1 (2.2)				45 (100.0)	17	62	0.07	0.33
合計 (%)	4,238 (80.0)	656 (12.4)	208 (3.9)	85 (1.6)	46 (0.9)	63 (1.2)	5,296 (100.0)	3,473	8,769	0.38	1.08
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)	4,238 (80.0)	656 (12.4)	208 (3.9)	85 (1.6)	46 (0.9)	63 (1.2)	5,296 (100.0)	3,473	8,769	0.38	1.08

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査