

表 3539 2015年中の出口部感染発症率(回/1患者・年) 医療機関別(腹膜透析患者)

医療機関	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明 記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	272	49	19	3	3	3	349	314	663	0.38	0.88
(%)	(77.9)	(14.0)	(5.4)	(0.9)	(0.9)	(0.9)	(100.0)				
私立大学	449	87	40	19	5	7	607	499	1,106	0.50	1.20
(%)	(74.0)	(14.3)	(6.6)	(3.1)	(0.8)	(1.2)	(100.0)				
国立	123	19	5	6	3	2	158	64	222	0.48	1.11
(%)	(77.8)	(12.0)	(3.2)	(3.8)	(1.9)	(1.3)	(100.0)				
県市町村立	778	126	32	14	10	15	975	598	1,573	0.40	1.16
(%)	(79.8)	(12.9)	(3.3)	(1.4)	(1.0)	(1.5)	(100.0)				
社会保険	162	26	7	2	3	1	201	321	522	0.34	0.98
(%)	(80.6)	(12.9)	(3.5)	(1.0)	(1.5)	(0.5)	(100.0)				
厚生連	279	35	2	2	1	5	324	236	560	0.27	1.10
(%)	(86.1)	(10.8)	(0.6)	(0.6)	(0.3)	(1.5)	(100.0)				
その他公的	690	81	22	12	6	8	819	540	1,359	0.30	0.95
(%)	(84.2)	(9.9)	(2.7)	(1.5)	(0.7)	(1.0)	(100.0)				
私立総合	227	56	11	6			300	63	363	0.33	0.67
(%)	(75.7)	(18.7)	(3.7)	(2.0)			(100.0)				
私立	872	124	48	15	9	16	1,084	615	1,699	0.40	1.17
(%)	(80.4)	(11.4)	(4.4)	(1.4)	(0.8)	(1.5)	(100.0)				
私立診療所	386	53	22	6	6	6	479	223	702	0.38	1.09
(%)	(80.6)	(11.1)	(4.6)	(1.3)	(1.3)	(1.3)	(100.0)				
総計	4,238	656	208	85	46	63	5,296	3,473	8,769	0.38	1.08
(%)	(80.0)	(12.4)	(3.9)	(1.6)	(0.9)	(1.2)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査