

表 3553 PET Cr D/P比 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	0.5未満	0.5~	0.65~	0.81~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	186 (11.0)	613 (36.3)	681 (40.3)	211 (12.5)	1,691 (100.0)	3,211	4,902	0.65	0.13
腹膜透析 (APD) (%)	84 (8.6)	327 (33.4)	416 (42.5)	152 (15.5)	979 (100.0)	1,796	2,775	0.67	0.14
腹膜透析 (CCPD) (%)	48 (10.9)	136 (30.9)	196 (44.5)	60 (13.6)	440 (100.0)	652	1,092	0.66	0.14
合計 (%)	318 (10.2)	1,076 (34.6)	1,293 (41.6)	423 (13.6)	3,110 (100.0)	5,659	8,769	0.66	0.13
記載なし (%)									
総計 (%)	318 (10.2)	1,076 (34.6)	1,293 (41.6)	423 (13.6)	3,110 (100.0)	5,659	8,769	0.66	0.13

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査