

表 3554 PET Cr D/P比 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)						1	1		
PD単独 (%)	221 (8.9)	853 (34.3)	1,068 (43.0)	344 (13.8)	2,486 (100.0)	4,618	7,104	0.66	0.13
HD(F)単独.PDカテ あり (%)									
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	72 (13.4)	186 (34.6)	206 (38.3)	74 (13.8)	538 (100.0)	932	1,470	0.65	0.14
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	24 (35.8)	27 (40.3)	12 (17.9)	4 (6.0)	67 (100.0)	65	132	0.55	0.15
PD.HD併用週3 HD(F) (%)									
PD.HD併用週4 HD(F) (%)									
PD.HD併用その他 (%)	1 (5.3)	10 (52.6)	7 (36.8)	1 (5.3)	19 (100.0)	43	62	0.64	0.10
合計 (%)	318 (10.2)	1,076 (34.6)	1,293 (41.6)	423 (13.6)	3,110 (100.0)	5,659	8,769	0.66	0.13
不明 (%)									
記載なし (%)									
総計 (%)	318 (10.2)	1,076 (34.6)	1,293 (41.6)	423 (13.6)	3,110 (100.0)	5,659	8,769	0.66	0.13

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査