

表 3575 PET Cr D/P比 治療方法(新分類)別(腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	0.5未満	0.5~	0.65~	0.81~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
腹膜透析 (CAPD) (%)	123 (8.9)	491 (35.5)	585 (42.3)	184 (13.3)	1,383 (100.0)	2,695	4,078	0.66	0.13
腹膜透析 (APD) (%)	68 (8.5)	267 (33.2)	349 (43.4)	120 (14.9)	804 (100.0)	1,489	2,293	0.67	0.14
腹膜透析 (CCPD) (%)	30 (10.0)	95 (31.8)	134 (44.8)	40 (13.4)	299 (100.0)	434	733	0.66	0.13
合計 (%)	221 (8.9)	853 (34.3)	1,068 (43.0)	344 (13.8)	2,486 (100.0)	4,618	7,104	0.66	0.13
記載なし (%)									
総計 (%)	221 (8.9)	853 (34.3)	1,068 (43.0)	344 (13.8)	2,486 (100.0)	4,618	7,104	0.66	0.13

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査