

表 3583 PET Cr D/P比 使用透析液の種類別（腹膜透析単独患者）

使用透析液の種類	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5%液のみ	137	445	356	89	1,027	967	1,994	0.63	0.13
(%)	(13.3)	(43.3)	(34.7)	(8.7)	(100.0)				
1.5%液と2.5%液の併用	23	95	119	22	259	257	516	0.65	0.12
(%)	(8.9)	(36.7)	(45.9)	(8.5)	(100.0)				
2.5%液のみ	5	15	31	13	64	66	130	0.69	0.13
(%)	(7.8)	(23.4)	(48.4)	(20.3)	(100.0)				
4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	1	3	3	1	8	4	12	0.57	0.23
(%)	(12.5)	(37.5)	(37.5)	(12.5)	(100.0)				
イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	2	4	8	5	19	33	52	0.70	0.14
(%)	(10.5)	(21.1)	(42.1)	(26.3)	(100.0)				
1.5%+イコデキストリン	36	157	334	140	667	534	1,201	0.70	0.13
(%)	(5.4)	(23.5)	(50.1)	(21.0)	(100.0)				
1.5%+2.5%+イコデキストリン	6	78	122	38	244	178	422	0.69	0.12
(%)	(2.5)	(32.0)	(50.0)	(15.6)	(100.0)				
2.5%+イコデキストリン	11	51	81	30	173	174	347	0.69	0.13
(%)	(6.4)	(29.5)	(46.8)	(17.3)	(100.0)				
4.25%液+イコデキストリン		1	2	2	5	5	10	0.79	0.14
(%)		(20.0)	(40.0)	(40.0)	(100.0)				
合計	221	849	1,056	340	2,466	2,218	4,684	0.66	0.13
(%)	(9.0)	(34.4)	(42.8)	(13.8)	(100.0)				
不明			1		1	5	6	0.80	
(%)			(100.0)		(100.0)				
記載なし		4	11	4	19	2,395	2,414	0.73	0.10
(%)		(21.1)	(57.9)	(21.1)	(100.0)				
総計	221	853	1,068	344	2,486	4,618	7,104	0.66	0.13
(%)	(8.9)	(34.3)	(43.0)	(13.8)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査