

表 3682 PD Kt/V 治療方法(新分類)別(腹膜透析患者)

| 治療方法<br>(新分類)         | 0.1未満       | 0.1～          | 0.4～          | 0.8～          | 1.2～          | 1.7～          | 2.0～         | 2.4～        | 合計               | 記載なし  | 総計    | 平均   | 標準偏差 |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------------|-------|-------|------|------|
| 腹膜透析<br>(CAPD)<br>(%) | 9<br>(0.7)  | 146<br>(11.0) | 152<br>(11.5) | 261<br>(19.7) | 451<br>(34.0) | 194<br>(14.6) | 73<br>(5.5)  | 41<br>(3.1) | 1,327<br>(100.0) | 3,575 | 4,902 | 1.21 | 0.61 |
| 腹膜透析<br>(APD)<br>(%)  | 2<br>(0.3)  | 58<br>(7.5)   | 78<br>(10.1)  | 206<br>(26.5) | 252<br>(32.5) | 97<br>(12.5)  | 47<br>(6.1)  | 36<br>(4.6) | 776<br>(100.0)   | 1,999 | 2,775 | 1.27 | 0.66 |
| 腹膜透析<br>(CCPD)<br>(%) | 3<br>(0.9)  | 27<br>(8.3)   | 24<br>(7.4)   | 67<br>(20.6)  | 110<br>(33.8) | 50<br>(15.4)  | 30<br>(9.2)  | 14<br>(4.3) | 325<br>(100.0)   | 767   | 1,092 | 1.32 | 0.62 |
| 合計<br>(%)             | 14<br>(0.6) | 231<br>(9.5)  | 254<br>(10.5) | 534<br>(22.0) | 813<br>(33.5) | 341<br>(14.0) | 150<br>(6.2) | 91<br>(3.7) | 2,428<br>(100.0) | 6,341 | 8,769 | 1.25 | 0.63 |
| 記載なし<br>(%)           |             |               |               |               |               |               |              |             |                  |       |       |      |      |
| 総計<br>(%)             | 14<br>(0.6) | 231<br>(9.5)  | 254<br>(10.5) | 534<br>(22.0) | 813<br>(33.5) | 341<br>(14.0) | 150<br>(6.2) | 91<br>(3.7) | 2,428<br>(100.0) | 6,341 | 8,769 | 1.25 | 0.63 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
 \*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの  
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
 2015年調査