

表 3683 PD Kt/V 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)										1	1		
PD単独 (%)	8 (0.4)	167 (8.4)	201 (10.2)	470 (23.8)	650 (32.9)	275 (13.9)	125 (6.3)	82 (4.1)	1,978 (100.0)	5,126	7,104	1.26	0.63
HD(F)単独.PDカテ あり (%)													
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	6 (1.6)	42 (11.1)	29 (7.7)	58 (15.3)	155 (40.9)	58 (15.3)	23 (6.1)	8 (2.1)	379 (100.0)	1,091	1,470	1.24	0.58
PD.HD併用週2 HD(F) (%)		22 (38.6)	24 (42.1)	2 (3.5)	4 (7.0)	3 (5.3)	1 (1.8)	1 (1.8)	57 (100.0)	75	132	0.60	0.54
PD.HD併用週3 HD(F) (%)													
PD.HD併用週4 HD(F) (%)													
PD.HD併用その他 (%)				4 (28.6)	4 (28.6)	5 (35.7)	1 (7.1)		14 (100.0)	48	62	1.49	0.35
合計 (%)	14 (0.6)	231 (9.5)	254 (10.5)	534 (22.0)	813 (33.5)	341 (14.0)	150 (6.2)	91 (3.7)	2,428 (100.0)	6,341	8,769	1.25	0.63
不明 (%)													
記載なし (%)													
総計 (%)	14 (0.6)	231 (9.5)	254 (10.5)	534 (22.0)	813 (33.5)	341 (14.0)	150 (6.2)	91 (3.7)	2,428 (100.0)	6,341	8,769	1.25	0.63

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査