

表 3744 総透析量 年齢(歳)別 (腹膜透析単独患者)

| 年齢           | 0.1未満      | 0.1～        | 0.4～        | 0.8～        | 1.2～          | 1.7～          | 2.0～          | 2.4～         | 2.8～         | 合計               | 記載なし  | 総計    | 平均   | 標準偏差 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------|-------|------|------|
| 15歳未満<br>(%) |            |             |             | 1<br>(3.6)  |               | 3<br>(10.7)   | 2<br>(7.1)    | 6<br>(21.4)  | 16<br>(57.1) | 28<br>(100.0)    | 61    | 89    | 2.90 | 0.87 |
| 15歳～<br>(%)  |            |             |             | 2<br>(8.3)  | 4<br>(16.7)   | 3<br>(12.5)   | 8<br>(33.3)   | 3<br>(12.5)  | 4<br>(16.7)  | 24<br>(100.0)    | 64    | 88    | 2.10 | 0.56 |
| 30歳～<br>(%)  |            | 7<br>(6.4)  | 6<br>(5.5)  | 3<br>(2.7)  | 26<br>(23.6)  | 23<br>(20.9)  | 29<br>(26.4)  | 5<br>(4.5)   | 11<br>(10.0) | 110<br>(100.0)   | 393   | 503   | 1.81 | 0.80 |
| 45歳～<br>(%)  | 1<br>(0.2) | 23<br>(5.4) | 16<br>(3.7) | 21<br>(4.9) | 128<br>(29.8) | 113<br>(26.3) | 76<br>(17.7)  | 29<br>(6.8)  | 22<br>(5.1)  | 429<br>(100.0)   | 1,297 | 1,726 | 1.71 | 0.69 |
| 60歳～<br>(%)  |            | 30<br>(3.9) | 15<br>(2.0) | 33<br>(4.3) | 175<br>(22.8) | 214<br>(27.8) | 169<br>(22.0) | 72<br>(9.4)  | 61<br>(7.9)  | 769<br>(100.0)   | 2,308 | 3,077 | 1.86 | 0.72 |
| 75歳～<br>(%)  | 3<br>(1.0) | 10<br>(3.2) | 7<br>(2.3)  | 28<br>(9.1) | 61<br>(19.8)  | 92<br>(29.9)  | 69<br>(22.4)  | 20<br>(6.5)  | 18<br>(5.8)  | 308<br>(100.0)   | 1,188 | 1,496 | 1.77 | 0.65 |
| 90歳～<br>(%)  |            | 1<br>(5.3)  |             | 3<br>(15.8) | 5<br>(26.3)   | 3<br>(15.8)   | 1<br>(5.3)    | 3<br>(15.8)  | 3<br>(15.8)  | 19<br>(100.0)    | 106   | 125   | 1.89 | 0.99 |
| 合計<br>(%)    | 4<br>(0.2) | 71<br>(4.2) | 44<br>(2.6) | 91<br>(5.4) | 399<br>(23.7) | 451<br>(26.7) | 354<br>(21.0) | 138<br>(8.2) | 135<br>(8.0) | 1,687<br>(100.0) | 5,417 | 7,104 | 1.82 | 0.73 |
| 不明<br>(%)    |            |             |             |             |               |               |               |              |              |                  |       |       |      |      |
| 記載なし<br>(%)  |            |             |             |             |               |               |               |              |              |                  |       |       |      |      |
| 総計<br>(%)    | 4<br>(0.2) | 71<br>(4.2) | 44<br>(2.6) | 91<br>(5.4) | 399<br>(23.7) | 451<br>(26.7) | 354<br>(21.0) | 138<br>(8.2) | 135<br>(8.0) | 1,687<br>(100.0) | 5,417 | 7,104 | 1.82 | 0.73 |
| 平均           | 74.50      | 61.23       | 59.91       | 66.07       | 62.58         | 63.83         | 62.65         | 61.78        | 56.05        | 62.43            | 63.84 | 63.50 |      |      |
| 標準偏差         | 14.89      | 12.41       | 12.64       | 15.59       | 12.66         | 13.46         | 14.91         | 17.28        | 23.30        | 15.14            | 15.06 | 15.09 |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査