

表 3746 総透析量 透析歴(年)別（腹膜透析単独患者）

透析歴	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	4 (0.5)	36 (4.5)	16 (2.0)	44 (5.5)	179 (22.5)	201 (25.3)	165 (20.8)	79 (9.9)	71 (8.9)	795 (100.0)	2,669	3,464	1.85	0.74
2年～ (%)		19 (3.0)	18 (2.8)	30 (4.7)	165 (25.9)	176 (27.6)	136 (21.4)	44 (6.9)	49 (7.7)	637 (100.0)	1,865	2,502	1.83	0.69
5年～ (%)		16 (7.0)	8 (3.5)	16 (7.0)	48 (21.1)	65 (28.6)	48 (21.1)	12 (5.3)	14 (6.2)	227 (100.0)	696	923	1.73	0.79
10年～ (%)			2 (10.5)		5 (26.3)	4 (21.1)	5 (26.3)	2 (10.5)	1 (5.3)	19 (100.0)	116	135	1.86	0.78
15年～ (%)				1 (20.0)		3 (60.0)		1 (20.0)		5 (100.0)	36	41	1.78	0.54
20年～ (%)											13	13		
25年～ (%)						2 (100.0)				2 (100.0)	5	7	1.75	0.07
30年～ (%)					1 (100.0)					1 (100.0)	2	3	1.50	
35年～ (%)											1	1		
40年～ (%)											2	2		
合計 (%)	4 (0.2)	71 (4.2)	44 (2.6)	91 (5.4)	398 (23.6)	451 (26.7)	354 (21.0)	138 (8.2)	135 (8.0)	1,686 (100.0)	5,405	7,091	1.82	0.73
不明 (%)					1 (100.0)					1 (100.0)	12	13	1.20	
記載なし (%)														
総計 (%)	4 (0.2)	71 (4.2)	44 (2.6)	91 (5.4)	399 (23.7)	451 (26.7)	354 (21.0)	138 (8.2)	135 (8.0)	1,687 (100.0)	5,417	7,104	1.82	0.73
平均	1.00	2.46	3.02	2.42	2.32	2.49	2.29	1.83	1.90	2.31	2.43	2.40		
標準偏差		2.51	2.91	2.71	2.66	2.94	2.34	2.30	1.92	2.60	3.16	3.04		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査