

表 3761 腹膜炎罹患回数(回/年) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD) (%)	2,542 (85.4)	334 (11.2)	67 (2.3)	21 (0.7)	7 (0.2)	4 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)			2,977 (100.0)	5	1,920	4,902
腹膜透析 (APD) (%)	1,457 (86.9)	175 (10.4)	34 (2.0)	7 (0.4)	2 (0.1)			1 (0.1)	1 (0.1)		1,677 (100.0)	10	1,088	2,775
腹膜透析 (CCPD) (%)	621 (87.8)	67 (9.5)	16 (2.3)	2 (0.3)						1 (0.1)	707 (100.0)		385	1,092
合計 (%)	4,620 (86.2)	576 (10.7)	117 (2.2)	30 (0.6)	9 (0.2)	4 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	5,361 (100.0)	15	3,393	8,769
記載なし (%)														
総計 (%)	4,620 (86.2)	576 (10.7)	117 (2.2)	30 (0.6)	9 (0.2)	4 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	5,361 (100.0)	15	3,393	8,769

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査