

表 3762 腹膜炎罹患回数(回/年) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)														1 1
PD単独 (%)	3,746 (85.6)	486 (11.1)	105 (2.4)	24 (0.5)	9 (0.2)	4 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)		4,377 (100.0)	12	2,715	7,104
HD(F)単独.PDカテ あり (%)														
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	747 (88.4)	79 (9.3)	12 (1.4)	5 (0.6)				1 (0.1)		1 (0.1)	845 (100.0)	3	622	1,470
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	86 (91.5)	7 (7.4)		1 (1.1)							94 (100.0)		38	132
PD.HD併用週3 HD(F) (%)														
PD.HD併用週4 HD(F) (%)														
PD.HD併用その他 (%)	41 (91.1)	4 (8.9)									45 (100.0)		17	62
合計 (%)	4,620 (86.2)	576 (10.7)	117 (2.2)	30 (0.6)	9 (0.2)	4 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	5,361 (100.0)	15	3,393	8,769
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	4,620 (86.2)	576 (10.7)	117 (2.2)	30 (0.6)	9 (0.2)	4 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	5,361 (100.0)	15	3,393	8,769

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査