

表 3818 出口部感染罹患回数(回/年) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)														1
PD単独 (%)	3,446 (79.8)	603 (14.0)	151 (3.5)	64 (1.5)	29 (0.7)	12 (0.3)	6 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)	2 (0.0)	4,319 (100.0)	13	2,772	7,104
HD(F)単独.PDカテ あり (%)														
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	679 (80.9)	115 (13.7)	35 (4.2)	7 (0.8)		1 (0.1)				2 (0.2)	839 (100.0)	3	628	1,470
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	70 (75.3)	18 (19.4)	3 (3.2)	1 (1.1)	1 (1.1)						93 (100.0)		39	132
PD.HD併用週3 HD(F) (%)														
PD.HD併用週4 HD(F) (%)														
PD.HD併用その他 (%)	43 (95.6)	1 (2.2)	1 (2.2)								45 (100.0)		17	62
合計 (%)	4,238 (80.0)	737 (13.9)	190 (3.6)	72 (1.4)	30 (0.6)	13 (0.2)	6 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)	4 (0.1)	5,296 (100.0)	16	3,457	8,769
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	4,238 (80.0)	737 (13.9)	190 (3.6)	72 (1.4)	30 (0.6)	13 (0.2)	6 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)	4 (0.1)	5,296 (100.0)	16	3,457	8,769

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査