

表 3837 出口部感染罹患回数(回/年) 年齢(歳)別 (腹膜透析単独患者)

年齢	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	40 (67.8)	6 (10.2)	5 (8.5)	3 (5.1)	3 (5.1)	1 (1.7)	1 (1.7)				59 (100.0)		30	89
15歳～ (%)	43 (76.8)	7 (12.5)	4 (7.1)		1 (1.8)	1 (1.8)					56 (100.0)		32	88
30歳～ (%)	239 (81.3)	37 (12.6)	13 (4.4)	2 (0.7)	2 (0.7)	1 (0.3)					294 (100.0)	3	206	503
45歳～ (%)	837 (78.8)	145 (13.7)	41 (3.9)	21 (2.0)	10 (0.9)	4 (0.4)	2 (0.2)		2 (0.2)		1,062 (100.0)	1	663	1,726
60歳～ (%)	1,515 (80.5)	265 (14.1)	54 (2.9)	28 (1.5)	10 (0.5)	4 (0.2)	1 (0.1)	3 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.1)	1,883 (100.0)	7	1,187	3,077
75歳～ (%)	714 (80.1)	133 (14.9)	31 (3.5)	8 (0.9)	3 (0.3)	1 (0.1)	1 (0.1)				891 (100.0)	2	603	1,496
90歳～ (%)	58 (78.4)	10 (13.5)	3 (4.1)	2 (2.7)			1 (1.4)				74 (100.0)		51	125
合計 (%)	3,446 (79.8)	603 (14.0)	151 (3.5)	64 (1.5)	29 (0.7)	12 (0.3)	6 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)	2 (0.0)	4,319 (100.0)	13	2,772	7,104
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	3,446 (79.8)	603 (14.0)	151 (3.5)	64 (1.5)	29 (0.7)	12 (0.3)	6 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)	2 (0.0)	4,319 (100.0)	13	2,772	7,104
平均	63.53	64.13	60.79	61.36	53.38	51.75	60.00	68.33	58.67	69.50	63.38	62.85	63.70	63.50
標準偏差	14.87	14.82	18.29	17.52	21.74	20.58	30.07	4.04	12.90	6.36	15.16	13.58	14.99	15.09

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査