

CD-ROM 収載の帳票の見方について

- 原則として、帳票は最初の項目が横軸、後の項目が縦軸、()内は出力した条件を表します。
(※レイアウトの関係上、縦軸と横軸が逆転することもあります。)

表 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 治療方法別 (透析患者全体)

治療方	2未満	2～4～	6～8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析											10.15	3.05
(%)	(0.2)	(1.8)	(6.3)	(14.9)	(24.5)	(25.3)	(16.6)	(7.4)	(3.0)	(100.0)		
血液透析濾過	18	131	525	1,662	3,681	4,351	2,953	1,358	505	15,184	1,669	10.71
(%)	(0.1)	(0.9)	(3.5)	(10.9)	(24.2)	(28.7)	(19.4)	(8.9)	(3.3)	(100.0)		2.86
血液透析	5	11	17	21	21	13	5	3	96	64	160	9.45
(%)	(5.2)	(11.5)	(17.7)	(21.9)	(21.9)	(13.5)	(5.2)	(3.1)	(100.0)			3.24
血液吸着透析	4	26	166	541	584	262	64	12	1,659	129	1,788	10.28
(%)	(0.2)	(1.6)	(10.0)	(32.6)	(35.2)	(15.8)	(3.9)	(0.7)	(100.0)			2.11
在宅血液透析	1	11	18	58	36	21	2	147	77	224	9.50	2.33
(%)	(0.7)	(7.5)	(12.2)	(39.5)	(24.5)	(14.3)	(1.4)	(100.0)				
腹膜透析	19	174	509	1,151	1,299	1,186	956	523	342	6,159	3,005	9,164
(%)	(0.3)	(2.8)	(8.3)	(18.7)	(21.1)	(19.3)	(15.5)	(8.5)	(5.6)	(100.0)		3.60
合計	449	4,464	15,315	36,872	61,432	63,728	41,896	18,875	7,710	250,741	31,255	281,996
(%)	(0.2)	(1.8)	(6.1)	(14.7)	(24.5)	(25.4)	(16.7)	(7.5)	(3.1)	(100.0)		10.18
												3.05

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

##V7710##

(C) Japanese Society for Dialysis Therapy

2009年調査

- 表内の項目が空白の部分は 0 を表します。

また、表内が白紙の帳票は、指定した条件に該当患者が見当たらない場合です。

以上