

表 125 2016年導入患者、年齢、原疾患別

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	1 (10.0)			1 (4.5)	8 (13.8)	31 (27.9)	55 (22.8)	117 (24.8)	189 (18.2)	228 (14.4)	295 (14.7)	355 (14.9)	538 (16.2)	898 (15.7)	862 (16.6)	954 (16.7)	936 (17.2)	545 (17.9)	155 (19.5)	18 (22.5)	6,186 (16.6)			6,186 (16.6)	69.65	13.78
慢性腎盂腎炎 (%)				1 (4.5)	3 (5.2)	4 (3.6)	1 (0.4)	3 (0.6)	7 (0.7)	11 (0.7)	16 (0.8)	13 (0.5)	23 (0.7)	41 (0.7)	33 (0.6)	38 (0.7)	32 (0.6)	25 (0.8)	7 (0.9)		258 (0.7)			258 (0.7)	68.53	14.94
急速進行性糸球体腎炎 (%)			1 (14.3)		2 (3.4)	5 (4.5)	1 (0.4)	1 (0.2)	9 (0.9)	3 (0.2)	7 (0.3)	17 (0.7)	40 (1.2)	62 (1.1)	76 (1.5)	89 (1.6)	96 (1.8)	53 (1.7)	11 (1.4)	2 (2.5)	475 (1.3)			475 (1.3)	73.30	12.18
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)								2 (0.4)	1 (0.1)	3 (0.2)	2 (0.1)	5 (0.2)	2 (0.1)	4 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)			24 (0.1)			24 (0.1)	60.33	13.97
その他の分類不能の腎炎 (%)	1 (10.0)	1 (12.5)		3 (13.6)	4 (6.9)	2 (1.8)	6 (2.5)	3 (0.6)	4 (0.4)	14 (0.9)	10 (0.5)	11 (0.5)	10 (0.3)	22 (0.4)	21 (0.4)	21 (0.4)	21 (0.4)	13 (0.4)	1 (0.1)	1 (1.3)	169 (0.5)			169 (0.5)	63.76	18.95
多発性囊胞腎 (%)	1 (10.0)	1 (12.5)			2 (3.4)	1 (0.9)	7 (2.9)	17 (3.6)	42 (4.1)	94 (5.9)	102 (5.1)	116 (4.9)	105 (3.2)	157 (2.7)	109 (2.1)	100 (1.7)	74 (1.4)	35 (1.2)	9 (1.1)		972 (2.6)			972 (2.6)	63.38	13.31
腎硬化症 (%)				1 (4.5)	3 (5.2)	7 (6.3)	18 (7.5)	36 (7.6)	66 (6.4)	97 (6.1)	139 (6.9)	168 (7.1)	253 (7.6)	609 (10.7)	687 (13.2)	981 (17.2)	1,188 (21.8)	774 (25.4)	233 (29.3)	25 (31.3)	5,285 (14.2)			5,285 (14.2)	75.06	11.66
悪性高血圧 (%)				1 (4.5)		1 (0.9)	5 (2.1)	13 (2.8)	24 (2.3)	16 (1.0)	24 (1.2)	13 (0.5)	18 (0.5)	32 (0.6)	34 (0.7)	33 (0.6)	41 (0.8)	26 (0.9)	7 (0.9)	2 (2.5)	290 (0.8)			290 (0.8)	65.91	16.53
糖尿病性腎症 (%)				1 (4.5)	2 (3.4)	12 (10.8)	63 (26.1)	182 (38.6)	496 (47.9)	874 (55.1)	1,091 (54.3)	1,323 (55.7)	1,785 (53.7)	2,875 (50.3)	2,393 (46.0)	2,327 (40.7)	1,762 (32.4)	760 (25.0)	147 (18.5)	10 (12.5)	16,103 (43.2)			16,103 (43.2)	67.30	12.22
SLE腎炎 (%)					1 (1.7)	3 (2.7)	5 (2.1)	5 (1.1)	11 (1.1)	19 (1.2)	16 (0.8)	20 (0.8)	21 (0.6)	27 (0.5)	36 (0.7)	26 (0.5)	21 (0.4)	7 (0.2)	1 (0.1)		219 (0.6)			219 (0.6)	63.48	14.71
アミロイド腎 (%)							2 (0.8)	1 (0.2)	1 (0.1)	3 (0.2)	6 (0.3)	8 (0.3)	7 (0.2)	13 (0.2)	15 (0.3)	12 (0.2)	9 (0.2)	3 (0.1)			80 (0.2)			80 (0.2)	67.13	12.32
痛風腎 (%)							1 (0.4)			2 (0.1)	10 (0.5)	5 (0.2)	9 (0.3)	12 (0.2)	11 (0.2)	11 (0.2)	8 (0.1)	3 (0.1)			72 (0.2)			72 (0.2)	67.47	11.48
先天性代謝異常による腎不全 (%)				1 (4.5)	4 (6.9)		2 (0.8)		3 (0.3)	1 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)			23 (0.1)			23 (0.1)	50.83	22.41
腎・尿路結核 (%)													1 (0.0)		2 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.1)	3 (0.1)			9 (0.0)			9 (0.0)	74.56	8.83
腎・尿路結石 (%)							1 (0.2)	2 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.1)	2 (0.1)	3 (0.2)	7 (0.1)	7 (0.1)	10 (0.2)	12 (0.1)	7 (0.1)	3 (0.1)		55 (0.1)			55 (0.1)	69.64	11.73
腎・尿路腫瘍 (%)							1 (0.2)	1 (0.1)	5 (0.3)	3 (0.1)	10 (0.4)	19 (0.6)	31 (0.5)	34 (0.7)	37 (0.6)	32 (0.6)	14 (0.5)	4 (0.5)			191 (0.5)			191 (0.5)	72.23	10.27
閉塞性尿路障害 (%)						1 (0.9)	1 (0.4)	1 (0.2)	2 (0.2)	2 (0.1)	3 (0.1)	5 (0.2)	9 (0.3)	18 (0.3)	8 (0.2)	23 (0.4)	12 (0.2)	6 (0.2)	1 (0.1)		90 (0.2)			90 (0.2)	70.58	12.37
骨髄腫 (%)								2 (0.2)	4 (0.3)	9 (0.4)	7 (0.3)	16 (0.5)	30 (0.5)	21 (0.4)	26 (0.5)	18 (0.3)	18 (0.6)	2 (0.3)			153 (0.4)			153 (0.4)	71.35	10.98
腎形成不全 (%)	2 (20.0)	1 (12.5)	3 (42.9)	3 (13.6)	7 (12.1)	1 (0.9)	5 (2.1)	6 (1.3)	3 (0.3)	1 (0.1)		2 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.0)	4 (0.1)	2 (0.0)	3 (0.1)				47 (0.1)			47 (0.1)	40.17	23.94
不明 (%)				2 (9.1)	5 (8.6)	25 (22.5)	44 (18.3)	46 (9.7)	109 (10.5)	135 (8.5)	179 (8.9)	206 (8.7)	314 (9.4)	640 (11.2)	608 (11.7)	766 (13.4)	903 (16.6)	583 (19.2)	177 (22.3)	17 (21.3)	4,759 (12.8)	2 (100.0)		4,761 (12.8)	72.26	13.41
再導入 (%)				3 (13.6)	1 (1.7)	6 (5.4)	5 (2.1)	12 (2.5)	24 (2.3)	26 (1.6)	29 (1.4)	17 (0.7)	30 (0.9)	31 (0.5)	15 (0.3)	15 (0.3)	11 (0.2)	12 (0.4)	1 (0.1)		238 (0.6)			238 (0.6)	57.85	15.84
その他 (%)	5 (50.0)	5 (62.5)	3 (42.9)	5 (22.7)	16 (27.6)	12 (10.8)	20 (8.3)	25 (5.3)	40 (3.9)	48 (3.0)	67 (3.3)	68 (2.9)	115 (3.5)	199 (3.5)	219 (4.2)	242 (4.2)	258 (4.7)	161 (5.3)	39 (4.9)	5 (6.3)	1,552 (4.2)			1,552 (4.2)	69.49	16.07
合計 (%)	10 (100.0)	8 (100.0)	7 (100.0)	22 (100.0)	58 (100.0)	111 (100.0)	241 (100.0)	472 (100.0)	1,036 (100.0)	1,585 (100.0)	2,011 (100.0)	2,375 (100.0)	3,326 (100.0)	5,712 (100.0)	5,201 (100.0)	5,718 (100.0)	5,439 (100.0)	3,043 (100.0)	795 (100.0)	80 (100.0)	37,250 (100.0)			37,252 (100.0)	69.40	13.36
記載なし																										
総計	10	8	7	22	58	111	241	472	1,036	1,585	2,011	2,375	3,326	5,712	5,201	5,718	5,439	3,043	795	80	37,250		2	37,252	69.40	13.36

数値下のかつこ内は列方向の合計に対する%です。

##A0060##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査