

表 130 2016年導入患者、治療方法(新分類)、性別

治療方法 (新分類)	男性	女性	合計	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	19,441 (81.5)	9,012 (82.4)	28,453 (81.8)	1 (100.0)	28,454 (81.8)
Off-line HDF (%)	109 (0.5)	59 (0.5)	168 (0.5)		168 (0.5)
On-line HDF (%)	2,140 (9.0)	883 (8.1)	3,023 (8.7)		3,023 (8.7)
Push/Pull HDF (%)	2 (0.0)		2 (0.0)		2 (0.0)
バイオフィルトレーション (%)	2 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)		3 (0.0)
IHDF (%)	672 (2.8)	304 (2.8)	976 (2.8)		976 (2.8)
血液濾過 (%)	1 (0.0)		1 (0.0)		1 (0.0)
血液吸着透析 (リクセル等使用) (%)	1 (0.0)		1 (0.0)		1 (0.0)
在宅血液透析 (%)	6 (0.0)	4 (0.0)	10 (0.0)		10 (0.0)
腹膜透析 (CAPD) (%)	730 (3.1)	381 (3.5)	1,111 (3.2)		1,111 (3.2)
腹膜透析 (APD) (%)	430 (1.8)	168 (1.5)	598 (1.7)		598 (1.7)
腹膜透析 (CCPD) (%)	117 (0.5)	30 (0.3)	147 (0.4)		147 (0.4)
透析離脱 (%)	66 (0.3)	28 (0.3)	94 (0.3)		94 (0.3)
生体腎移植 (親から) (%)	60 (0.3)	19 (0.2)	79 (0.2)		79 (0.2)
生体腎移植 (祖父母から) (%)					
生体腎移植 (兄弟から) (%)	13 (0.1)	8 (0.1)	21 (0.1)		21 (0.1)
生体腎移植 (子から) (%)	2 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.0)		4 (0.0)
生体腎移植 (それ以外の血縁者から) (%)	1 (0.0)		1 (0.0)		1 (0.0)
生体腎移植 (配偶者から) (%)	45 (0.2)	30 (0.3)	75 (0.2)		75 (0.2)
生体腎移植 (上記以外から) (%)	3 (0.0)	3 (0.0)	6 (0.0)		6 (0.0)
献腎移植 (生体腎か献腎か不明の場合) (%)	6 (0.0)	2 (0.0)	8 (0.0)		8 (0.0)
献腎移植 (%)					
合計 (%)	23,847 (100.0)	10,934 (100.0)	34,781 (100.0)	1 (100.0)	34,782 (100.0)
記載なし	1,660	810	2,470		2,470
総計	25,507	11,744	37,251	1	37,252

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

\*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

##A0065##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査