

表 135 2016年導入患者 生検等により確認された原疾患

原疾患	男性	女性	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	156 (10.8)	88 (12.3)		244 (11.3)
IgA腎炎	238 (16.5)	137 (19.1)		375 (17.3)
その他の増殖性腎炎	42 (2.9)	25 (3.5)		67 (3.1)
膜性腎症	40 (2.8)	20 (2.8)		60 (2.8)
膜性増殖性腎炎	25 (1.7)	13 (1.8)		38 (1.8)
慢性腎孟腎炎	9 (0.6)	1 (0.1)		10 (0.5)
その他の間質腎炎	15 (1.0)	17 (2.4)		32 (1.5)
急速進行性糸球体腎炎	54 (3.7)	50 (7.0)		104 (4.8)
妊娠腎/妊娠中毒症		1 (0.1)		1 (0.0)
その他の分類不能の腎炎	14 (1.0)	7 (1.0)		21 (1.0)
遺伝性腎炎	9 (0.6)	4 (0.6)		13 (0.6)
多発性囊胞腎	57 (3.9)	35 (4.9)		92 (4.3)
腎硬化症	178 (12.3)	78 (10.9)		256 (11.8)
悪性高血圧	15 (1.0)	3 (0.4)		18 (0.8)
糖尿病性腎症	83 (5.7)	29 (4.0)		112 (5.2)
1型糖尿病	34 (2.4)	7 (1.0)		41 (1.9)
2型糖尿病	433 (30.0)	156 (21.8)		589 (27.2)
SLE腎炎	9 (0.6)	18 (2.5)		27 (1.2)
その他の自己免疫性腎炎	13 (0.9)	14 (2.0)		27 (1.2)
アミロイド腎	12 (0.8)	12 (1.7)		24 (1.1)
痛風腎	6 (0.4)			6 (0.3)
先天性代謝異常による腎不全	3 (0.2)	2 (0.3)		5 (0.2)
合計	1,445 (100.0)	717 (100.0)		2,162 (100.0)

数値右のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

##A0070##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査